

LOKALISIERTE NIERENEITERUNG
UND PARANEPHRITIS
»»»»» DURCH TRAUMA ENTSTANDEN «««««

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE
IN DER GESAMTEN MEDIZIN AN DER
MEDIZINISCHEN FAKULTÄT DER UNIVER-

// SITÄT MARBURG //

VORGELEGT VON HANS MÜLLER

// AUS RÜDESHEIM. //

LOKALISIERTE NIERENEITERUNG UND PARANEPHRITIS

»»»»»»»» DURCH TRAUMA ENTSTANDEN ««««««««

INAUGURAL=DISSERTATION

ZUR ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE
IN DER GESAMTEN MEDIZIN AN DER
MEDIZINISCHEN FAKULTÄT DER UNIVER=

// SITÄT MARBURG //

VORGELEGT VON HANS MÜLLER

// AUS RÜDESHEIM. //





Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41556027_0091


LOKALISIERTE NIERENEITERUNG
UND PARANEPHRITIS
DURCH TRAUMA ENTSTANDEN

VON

H. MÜLLER



MEINEN LIEBEN ELTERN
GEWIDMET.



Die Eiterungsprozesse in der Umgebung der Nieren sind vielfach Gegenstand eingehender experimenteller, klinischer und statistischer Arbeiten gewesen. Vergleicht man ihre Ergebnisse, so ist zunächst festzustellen, daß Einigkeit besteht über die Wichtigkeit der Frühdiagnose, die Symptome, die geeignet sind, das Krankheitsbild als solches zu erkennen und über das Ziel: die möglichst frühzeitige Eröffnung des Abscesses. Ueber die praktisch = klinische Seite der Krankheit herrscht also im allgemeinen Klarheit. Weniger ist das dagegen bei den Fragen der Fall, die sich mit der pathologisch = anatomischen und bakteriologischen Seite der Erkrankung befassen.

Was soll man als paranephritischen Absceß bezeichnen und in welche Unterabteilung soll man bei der Verschiedenheit der Entstehung das Krankheitsbild zerlegen? Für die pathologisch = anatomische Lokalisation der Abscesse spielt die Anwesenheit der mit einem eigenen Gefäß = Lymph = und Nerven system versehenen Nierenfett = kapsel, der fascia renalis Gerota, eine große Rolle, die aus einem hinteren stärkerem Blatt, der sogenannten Zuckermandlschen Faszie und einem vorderen schwächeren Blatt besteht. Niere, Nierenfett und Nebenniere werden von ihr eingeschlossen; nach oben setzt sie sich an das Zwergfell an und steht nach unten mit dem retroperitonealen Bindegewebe in freier Verbindung. Was ist nun also ein paranephritischer Absceß? Rehn *, dem wir eine ausführliche Arbeit über den Gegenstand verdanken,

* über Frühdiagnose und Frühoperation der metastatischen Eiterung in der Nierenfettkapsel Beitr. z. kl. Chirurgie 1911 Band 75 Heft 11.

möchte diese Bezeichnung für die Prozesse reserviert wissen, die sich auf das Gebiet außerhalb der fascia renalis Gerota beschränken. Sitzt der Eiter aber innerhalb dieser Fascie, so soll die Bezeichnung „perinephritischer Absceß“ gewählt werden, wie sie ursprünglich von R a y e r, einem der ältesten Autoren, die über diese Erkrankung schrieben, verwandt wurde. R e h n sucht die Wahl seiner Bezeichnung mit anatomisch=physiologischen Gründen zu rechtfertigen. Er hält die Nierenfettkapsel für ein Gebilde, das analog dem Netz bakterizide Kräfte besitzt und die Tendenz hat, sich gegen Eitererreger zu schützen, die von außen eindringen. Trotz dieser gewichtigen Gesichtspunkte hat sich der Name „perinephritischer Absceß“ nicht recht eingebürgert, zum Teil wohl deswegen, weil, wie z. B. S i m o n zu Beginn seiner Arbeit* über den paranephritischen Absceß erklärt, es sich gewöhnlich nicht recht feststellen läßt, ob der Absceß zunächst außerhalb oder innerhalb der Fettkapsel entstanden ist, da der Eiter bei längerem Bestehen und stärkerem Druck die Kapsel durchdringt. Man spricht also gewöhnlich ganz allgemein von paranephritischen Abscessen.

Wie lassen sich nun die Abscesse ihrer Entstehung nach einteilen?

S i m o n hat sie in primäre und sekundäre geschieden.

R i e d e l** dagegen hält diese Einteilung für un Zweckmäßig und faßt zusammen:

1. Die Abscesse, die von einer bis dahin gefunden Niere oder Nierenkapsel ausgehen,
2. die Abscesse, die infolge Durchbruch bei einer tuberkulösen oder einer Steinniere entstanden sind,
3. in solche, die einer Fortleitung von benachbarten Organen, z. B. Parametrium oder Appendix etc. ihre

* Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 1914 Band 131.

** Retro= und pararenale Abscesse, Nephritis purulenta=Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie 1917 Band 29.

Entstehung verdanken. Die unter 1 genannten Abscesse sind nach seiner Ansicht die paranephritischen im engeren Sinne; bei den übrigen wäre jeweils die Aetiologie besonders hinzuzufügen z. B. also: paranephritischer Abscess nach Appendicitis usw. Für die Auffassung Riedels, daß die Einteilung in primäre und sekundäre Abscesse schlechthin etwas mißliches habe, spricht die Ueberlegung, daß man danach eine embolische, von der Niere aus ins paranephritische Gewebe durchgebrochene Eiterung als primäre bezeichnen würde, dagegen die gleiche Eiterung, wenn sie von einem anderen Organ der Nachbarschaft fortgeleitet wird, eine sekundäre nennen müßte.

Ich möchte also mit Riedel als paranephritische Abscesse schlechthin nur solche bezeichnen, die, um seine Worte zu gebrauchen, bei vorher gesunder Niere bezw. Nierenfettkapsel entstanden sind.

Was nun die bakterielle Aetiologie anbetrifft, so haben die darauf gerichteten Untersuchungen ergeben, daß in der großen Mehrzahl der Fälle der Staphylokokkus aureus als Erreger anzusehen ist. Die Staphylokokken haben außerdem nach den Versuchen von Lenhards eine außergewöhnliche starke Neigung zur Metastasenbildung. Er stellt zusammen:

von 160 Fällen von Streptokokkensepsis 65 Prozent ohne und 35 Prozent mit Metastasen, von 22 Fällen von Staphylokokkensepsis 5 Prozent ohne und 95 Prozent mit Metastasen.

Nach Kochs Untersuchung ist bei intravenöser Injektion von virulenten Staphylokokken in die Blutbahn von Kaninchen die Reihenfolge der Organe die der Staphylokokkus am meisten befällt: Niere, Herz, Lunge, Milz und Knochenmark. Die Niere steht also an erster Stelle.

O. Harzbecker* fand bei Zusammenstellung der

* Ueber metastatisch paranephritische Abscesse. Archiv für klin. Chirurgie 1912 Band 98.

die Nieren durchwandernden Bakterien ein deutliches Ueberwiegen des Staphylokoccus aureus. Die Niere wird in den meisten Fällen von den Bakterien glatt paßiert.

Warum bildet aber die Niere bezw. die Nierenfettkapsel eine Prädisloktionsstelle für die Ansiedelung der Staphylokokken.?

K ü f t e r* giebt als sicheren Grund örtliche Veränderungen an, die nicht nur das Haften der Parasiten ermöglichen, sondern auch für die weitere Entwicklung einen günstigen Nährboden geben. J. K o c h** hat die Frage, warum gerade die Niere bezw. die Nierenfettkapsel von den Staphylokokken als Ansiedelungsort begünstigt werden, experimentell bearbeitet. Er spritzte einem Kaninchen 2 ccm einer fast avirulenten Staphylokoccus=aureuskultur intravenös ein. Nach einer halben Stunde waren die Staphylokokken im Blut nicht mehr nachweisbar. Sie gingen nicht im Blut selbst zugrunde, sondern wurden in den Organen, besonders der Leber abgelagert. Eine Ausscheidung durch die Niere erfolgt nicht. Bei Steigerung der Menge derselben Staphylokokkenkultur — 3 ccm — brauchte das Blut 5 — 15 Stunden, um sich der Kokken zu entledigen. Bei Injektion einer ganzen Bouillonkultur — etwa 5 ccm — desselben Staphylokoccus waren die Kokken im Blut reichlicher vorhanden, ferner fand eine Ausscheidung von der Leber in die Galle statt, sowie durch die Nieren in den Urin und zwar schon von der vierten Stunde an. Die Schlußsätze der Koch'schen Veröffentlichung lauten dahin, daß es nach intravenöser Einspritzung von Staphylokokkenkulturen, bei Verwendung von nicht zu geringen Mengen, regelmäßig zur Ausscheidung der Bakterien durch die

* Chirurgie der Niere.

** Ueber die haematog. Entstehung der eitrigen Nephritis durch den Staphylokoccus. Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten, 1908 Band 61.

Nieren kommt, und zwar tritt diese um so deutlicher in die Erscheinung, je virulenter die Staphylokokken sind und je größer die eingespritzte Menge ist. Ferner geht Koch von der Annahme aus, daß die Staphylokokken im Gegensatz zu den Streptokokken ein lösliches Toxin produzieren, welches die Nieren schädigt, wodurch dann ein *locus minoris resistentiae* entsteht, an dem sich die Staphylokokken ansiedeln und vermehren können. Unterstützt wird die Anliedlungsmöglichkeit dadurch, daß die Nierenarterien Endarterien sind, sodaß in sie gelangte Kokkenhaufen gewissermaßen dem Blutstrom entzogen sind und ungestört dort ihre Toxine ablagern können. Sekundär soll dann im allgemeinen der Durchbruch in die Fettkapsel erfolgen. Wenn einmal, was nicht die Regel sein soll, der Absceß primär in der Fettkapsel sich entwickelt, so wäre dieser Vorgang so zu erklären, daß sich, da die *Venae perirenales* mit den Venen der Niere in Verbindung stehen, die Traubenkokken gewissermaßen auf diesem Wege „verirrt“ haben. Dieser Ansicht ist Rehn beigetreten und erklärt ebenfalls, es sei einstweilen der Lehrsatz aufzustellen, daß metastatische Eiterungen in der *capsula adiposa* in der Mehrzahl der Fälle als von der Niere fortgeleitete Prozesse aufzufassen seien. In seinen Experimenten gelang es ihm festzustellen, daß durch Schädigung der Nieren von Kaninchen durch Chloroformnarkose, sowohl Nierenrinden- wie Nierenfettkapselabscesse zu erzielen waren. Wie oft das eine und wie oft das andere der Fall ist, darüber fehlen bei ihm die Angaben, obgleich das nach Riedel der springende Punkt sein müßte.

Riedel sucht dieser Entscheidung auf zweifachem Wege durch seine Statistik und durch theoretische Uebersetzung näher zu kommen. Er gelangt dabei zu einem der Anschauung von Rehn entgegengesetzten Resultat, nämlich, daß in der Mehrzahl der Fälle die Entstehung der Abscesse nicht primär in der Niere, sondern primär

in der Fettkapsel zu suchen sei. Bei 15 fraglichen Fällen waren es nur 2, in denen sich mit Sicherheit die Nieren als primär erkranktes Organ nachweisen ließen, in allen übrigen Fällen war die Entstehung primär in der Fettkapsel wahrscheinlich. Danach wären also nicht die Endarterien der Nieren und die Ablagerung der Staphylokokken in denselben, sowie die dadurch ermöglichte Absonderung des Toxins das Wesentliche, sondern der locus minoris resistentiae wäre in der Fettkapsel selbst zu suchen. Warum soll das der Fall sein?

Nach Riedel bewegt sich die Niere mit jedem Atemzuge in der Fettkapsel auf und ab, sich um ca. 1 cm verschiebend. Die sonstigen retroperitonealen Fettmassen liegen ruhig. Vielleicht wird durch diese Bewegung der Niere der Abfluß des Blutes aus den Capillaren etwas gehindert, oder es besteht die Neigung zu kapillären Blutungen, etwa hervorgerufen durch Hustenstöße. Letzteres erscheint ihm als das wahrscheinlichste. Beide Ansichten gehen also von der Annahme des locus minoris resistentiae aus. Koch und Riedel verlegen ihn in die Nierenfettkapsel. Welche Theorie häufiger das Richtige trifft, dürfte sich schwer entscheiden lassen. Bei der Rhenischen Theorie ist es schwer verständlich, warum überhaupt durch Chloroformschädigung der Nieren primäre Fettkapselabszesse entstehen können, anderseits sind aber auch die Riedelschen Erklärungsversuche nicht sehr befriedigend. Nur eine über viele Fälle fortgesetzte, auf diese Fragen gerichtete Beobachtung könnte hier Klarheit bringen. Wesentlich einfacher ist natürlich die Sache, wenn der Erkrankung ein Trauma nachweislich vorangegangen ist. In diesem Falle dürfte man nicht genötigt sein, auf die Endarterien, die Produktion des Toxins oder auf Schädigung der Fettkapsel durch die Atembewegungen zurückzugreifen, sondern da ist wohl unbestritten der locus minoris resistentiae eben dort, wo dieses Trauma seine schädigende Wirkung ausübte, sei es in der Niere, sei

es in der Fettkapsel, sei es in beiden. Denn dadurch entstehende Blutanfammlungen werden äußerst langsam resorbiert und können unter Umständen noch nach Jahren als Ansiedelungsort für Parasiten dienen. Daß das Trauma eine hohe Bedeutung für die Ansiedelung der Kokken hat, wurde durch wiederholte Versuche Kochs bewiesen. Nachdem er einem Kaninchen eine geringe Menge einer virulenten Staphylokokkenkultur in die Ohrvenen eingespritzt hatte, erzeugte er nach der Injektion künstlich Frakturen, Zerreißen und Quetschungen. Ueberall, wo infolge des Traumas Knochen- oder Weichteilverletzungen stattgefunden hatten, wo ein locus minoris resistentiae war, bildeten sich durch Ansiedelungen der Kokken Eiterherde.

Der locus minoris resistentiae muß nach Koch nicht notwendig einem Trauma seine Entstehung verdanken, sondern jedes tote Gewebe, z. B. die verschiedenen Cysten bei Nephritis, bilden einen Boden, auf dem sich die Traubenkokken mit Vorliebe ansiedeln.

In die Gruppe der paranephritischen Abscesse, bei denen ein Trauma den locus minoris resistentiae schuf, gehört auch folgender Fall aus der Marburger Universitätsklinik:

Patientin A. F. aus J. hatte als Kind Masern, sonst nie krank gewesen. Vor ungefähr 5 Wochen wurde sie von einer Kuh heftig in die Seite gestoßen; hierauf führte sie die Schmerzen zurück, die etwa 8 Tage später auftraten und meist dauernd vorhanden waren. Manchmal hatte sie Erbrechen. Beim tiefen Atmen bestanden Schmerzen in der rechten Seite. Der Appetit war schlecht, gleichzeitig bestand starke Gewichtsabnahme; in den letzten Tagen leidet sie an Durchfällen. Von Angina, Furunkulose oder einer Verletzung ist Patientin nichts bekannt.

Statu s.

Patientin macht einen kranken Eindruck; der Ernährungszustand ist stark reduziert.

Oedeme bestehen nicht. Herz und Lunge sind ohne krankhaften Befund. Auf der rechten Seite ist die Lenden-

und Bauchmuskulatur stark gespannt; infolgedessen gelingt es nur selten, den unteren Pol der rechten Niere, der auf Druck schmerzhaft ist, zu fühlen. Linke Niere ist nicht fühlbar. Es besteht leichtes unregelmäßiges Fieber. Urinmenge ist gering; 450 bis 650 ccm. Eiweiß und Blutbefund im Urin positiv. Im Sediment einzelne Leukocythen und Plattenepithelien.

16. 6. rechte Niere heute gut fühlbar. Sie ist deutlich vergrößert und auf Druck sehr schmerzhaft.

19. 6. derselbe Befund. Temperatur ist erhöht. Die Cystoskopie ergibt in der Blase keinen krankhaften Befund. Der rechte Ureter entleert wenig Urin, der Eiweiß, Blut und Leukocythen enthält.

26. 6. Operation. — Geh. Rat Dr. König.

Bergmannscher Nierenschnitt. Schwierige Ablösung der Niere vom Bauchfell, das mehrfach einreißt, es besteht eine Infiltration in die Fettkapsel. In der Mitte der Nierenoberfläche gegen das Bauchfell pralle, fluktuierende Schwellung, aus der sich an einer Stelle eine dicke Eitermasse entleert. Es gelingt durch Abschieben den oberen Teil der Niere zu erreichen, der gesund zu sein scheint. Die Niere wird von rückwärts her frei gemacht und damit auch der untere Pol zugänglich. Nach vorn unten ist die Verwachsung mit dem Bauchfell am stärksten. Der Hilus der Niere wird von oben her mit den großen Gefäßen freigelegt; die einzelnen Gefäße werden abgebunden. Beim weiteren Ablösen des Peritoneums wird es nochmals eröffnet und sofort wieder geschlossen und vernäht. Nach völliger Isolierung des Peritoneums von der Niere wird der nicht verdickte Ureter abgebunden, Tamponade der Wunde mit Vioformgaze; Einlegen eines Drainrohres.

3. 7. Entfernung des Drains.

Allgemeine Störungen sind nicht eingetreten.

Die Urinmenge wird reichlicher.

9. 7. im Urin Eiweiß Befund positiv, Blutbefund negativ.

Im Sediment zahlreiche Leukocythen, Platten- und einige Nierenepithelien. Ab und zu ein Erythrocyt.

5. 8. Wunde heilt gut bis auf eine kleine Fistel. Aufstehen.

12. 8. Wohlbefinden. In ambulante Behandlung entlassen.

Das Präparat zeigt: Paranephritische Eiterung, in der Niere ein keilförmiger eitriger Herd bis an das Nierenbecken.

Bakt. Befund.

Reinkultur von *Staphylococcus aureus*.

Daß im geschilderten Falle die Niere der Ansiedelungsort für die Bakterien war, ist wohl mit Bestimmtheit anzunehmen; denn dafür spricht der keilförmige Herd, der wohl zweifellos aus einem ischaemischen Infarkt nach einer bei dem Trauma entstandenen Ruptur eines Arterienastes gedeutet werden muß. Durch die Nekrose des Nierengewebes war eben das gegeben, was man der Infektion gegenüber als *locus minoris resistentiae* oder auch als guten Nährboden bezeichnen kann. Es bleibt nur die Frage: Wie sind die Staphylokokken in die Blutbahn gekommen?

Wenn man auf dem Standpunkte steht, daß jeder paranephritische Absceß eine metastatische Erkrankung ist, so muß man wohl annehmen, daß in unserem Falle eine leichte Angina, eine nicht beachtete geringe Verletzung, auch wenn sie schon lange ausgeheilt und vergessen war, die Eingangspforte für die Bakterien gewesen ist. Indessen ist es eine andere Frage, ob man wirklich ohne weiteres jede Paranephritis als metastatischen Prozeß aufzufassen berechtigt ist, d. h. als solchen, bei dem ein anderer Krankheitsprozeß ursächlich vorausgegangen ist.

Auch hierüber ist viel diskutiert worden. Bekanntlich gelang es Garré und Schimmelbusch, bei

sich selber Furunkel dadurch zu erzeugen, daß sie sich in die unverfehrte Haut Staphylokokkenkulturen einrieben: also Entstehung einer Staphylokokkeninfektion lediglich durch mechanische Ursache ohne weitere Schädigung. Man könnte sich also recht gut vorstellen, daß einmal Staphylokokken durch die intakte Haut in das Lymphsystem, von da in die Blutbahn gelangten, und auf diesem Wege einen paranephritischen Absceß erzeugten. Das würde dann ein nicht metastatischer, primärer paranephritischer Absceß sein. Auch auf Grund der von den Autoren veröffentlichten Statistiken ist diese Möglichkeit durchaus nicht von der Hand zu weisen. Auffallend ist bei der Durchsicht des statistischen Materials über paranephritische Abscesse die große Menge der Erkrankungen mit unbekannter Aetiologie.

K ü f t e r stellt 230 Fälle zusammen, davon sind 3 mal Eiterungen an entfernter Körperstelle die Ursache, von den übrigen Fällen haben 67 die Ursache: Unbekannt.

Als Genese des paranephritischen Abscesses giebt K ü f t e r Erosion, Furunkel, Ekzem und Angina an, außerdem noch die beträchtliche Anzahl von Infektionskrankheiten.

R e h n erwähnt als Ursache: Furunkel, Karbunkel, Ekzem, eine kleine eitrige Hautwunde, eine kleine Drüseneiterung, ein Panaritium, überhaupt alle Prozesse, welche Gelegenheit bieten, daß Eitererreger ins Blut gelangen können. Ferner wurden von R e h n paranephritische Abscesse beobachtet nach Angina, Influenza, Masern, Typhus, Pocken, Gonorrhoe, Peritonitis, Empyem usw. Man erfährt von allen diesen Dingen in der Regel nichts, weil sie längst verheilt und vergessen sind.

J. H y k y s * fand bei der größten Zahl seiner beobachteten Fälle eine frische oder vor kurzem verheilte periphere Affektion. Daß zwischen Paranephritis und äußeren Eiterungen Zusammenhänge bestehen, zeigten

* Ueber Paranephritis: Zentral-Blatt für Chirurgie 1916 No. 42.

schon D a g a und L e D e n t u , die Lendenphlegmonen nach der Heilung eines Panaritiums sahen, und F r e e s , der bei einer Schwangeren, die Scabies hatte, eine Lendenphlegmone auftreten sah.

R i e d e l beobachtete von 51 Fällen 20 mit unbekannter Genese. S i m o n stellt von 1888 bis Ende 1911 35 Fälle von paranephritischen Abscessen zusammen; davon sind 8 Abscesse, 2—3 mal indirekte, 4 mal direkte Traumen, 2 mal Para- und Perimetritis, 1 mal Tuberkulose die Ursache; von 15 Fällen bleibt der Ursprung unklar.

N e n t w i g stellt in einem Vortrag in der schles. Gesellschaft für vaterländ. Kultur 101 Fälle von paranephritischen Abscessen, die er im Laufe von 10 Jahren in der preuß. Armee beobachtet hat, zusammen. — citiert nach S i m o n — Er kommt zu dem Ergebnis, daß von diesen 101 Fällen 22 durch Unfall und 42 durch eitrige Prozesse bedingt waren, während bei den 37 restierenden Fällen keine aetiologischen Schlüsse gezogen werden konnten.

In seiner Arbeit — über Paranephritis und Pyonephrose nach Hautfurunkeln — erwähnt A. K a h n , N i e d e n , der von 166 Fällen von Paranephritis 28 aus unbekannter Ursache aufzählt. K a h n nennt diese Form eine „rudimentäre Pyaemie“ von sogenanntem kryptogenetischem Charakter. Er schildert ferner einen Fall von „spontaner Paranephritis“ mit hohem Fieber und schweren Allgemeinerscheinungen, bei dem es unmöglich war, etwas über die Aetiologie herauszubringen. Nach R e h n bezeichnete man früher die aetiologisch unklaren Fälle als idiopathische.

Ueberblickt man die zuletzt mitgeteilten Statistiken, so findet man bei einer so unverhältnismäßig großen Zahl von Fällen die Angabe: „Aetiologie unklar“, daß die Möglichkeit einer primären Entstehung nicht ganz von der Hand zu weisen ist.

